

Individuální vyšetření:

Dle nám dostupných aktuálních informací z okolních států Evropy, je všude stále dodržován postup vyšetření v indikovaném případě.

Indikovaný případ je případ splňující podmínky stanovené ECDC pro suspektní případ.

Suspektní případ vyžadující laboratorní diagnostiku je definován jako:

Pacient s akutním respiračním onemocněním (náhlý začátek alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, teplota, dušnost), které vyžaduje nebo nevyžaduje hospitalizaci

A

u kterého bylo v období 14 dní před začátkem prvních příznaků splněno alespoň jedno z následujících epidemiologických kritérií:

- byl v úzkém kontaktu s potvrzeným nebo pravděpodobným případem infekce COVID-19

NEBO

- pobýval v oblasti s předpokládaným přenosem onemocnění v populaci*

* Lidé s

a) akutní respirační infekcí vyžadující nebo nevyžadující hospitalizaci a

b) návratem z oblastí s předpokládaným rozšířeným přenosem ve Společenství splňují kritéria pro testování.

Kritéria pro laboratorní testování osob uvedených v bodě a nebo b by měla být vyhodnocena případ od případu a měla by být založena na národních doporučeních.

Blízký kontakt

Blízký/úzký kontakt pravděpodobného nebo potvrzeného případu je definován jako:

- osoba, která žije ve společné domácnosti s případem onemocnění COVID-19
- osoba, která měla přímý fyzický kontakt s případem onemocnění COVID-19 (např. podání ruky)
- osoba, která měla nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety případu onemocnění COVID-19 (např. při kašli, kontaktu holou rukou s použitými papírovými kapesníky)
- osoba, která byla v bezprostřední blízkosti (face to face) s případem onemocnění COVID-19 ve vzdálenosti do dvou metrů a po dobu delší než 15 minut
- osoba, která sdílela stejné uzavřené prostředí ve vzdálenosti menší než 2 metry a po dobu delší než 15 minut s případem onemocnění COVID-19 (např. ve třídě, v zasedací místnosti, v čekárně ve zdravotnickém zařízení)
- zdravotnický pracovník nebo jiná osoba přímo pečující o případ onemocnění COVID-19 nebo laboratorní pracovníci manipulující se vzorky od nemocného s COVID-19 bez použití doporučených osobních ochranných prostředků (OOP) nebo při poškozených OOP
- kontakt v letadle sedící dvě sedadla (v jakémkoliv směru) od nemocného s COVID-19, doprovod nebo osoba poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje rozsáhlejší expozici nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící v celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla) <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-guidelines-infectious-diseases-transmitted-aircraft-ragida-middle>

Epidemiologická souvislost se může vyskytnout během 14denního období před nebo po nástupu prvních příznaků u daného případu.

Úkolem kolegů z KHS a infekčních klinik je tedy zhodnotit tato kritéria a u osoby, která je splňuje zajistit laboratorní vyšetření.

Nevím, že by se v Evropě přistoupilo k vyšetřování u jiných než suspektních případů.

Taková situace by přinesla mnoho otázek. Vzhledem k zatím ne zcela prozkoumanému způsobu chování viru. Zatím není dostatek ověřených informací o tom, zda existuje například nosičství viru. Negativní výsledek vyšetření u osoby bez jakýchkoliv klinických příznaků popsaných výše by mohl vést k falešně negativním závěrům.

Výsledek vyšetření osoby bez klinických příznaků vypovídá pouze **o situaci v okamžiku odběru** a nemůže sloužit např. jako doklad o „neinfekčnosti“.

Mluvíme stále o vyšetření průkazu nukleové kyseliny viru v odebraném vzorku. Zatím nejsou dostupné testy na průkaz protilátek, které by následně mohly říci něco i o imunitním stavu osob.

Aktuálně tedy nejsou neindikovaná vyšetření prováděna. Situace se samozřejmě může změnit, o změně bude veřejnost informována.

V Praze dne 26.2.2020 (aktualizace case definice ECDC 26.2.2020)

Zpracoval: B. Macková